

Производитель



Вакцины  
Вашего Выбора

Эффективная защита  
собак от основных  
инфекционных болезней

# МУЛЬТИКАН 4 | 6 | 8 | АСТЕРИОН

DHPPIL | DHPPILR



Торговый Дом «ПРОСТОР»

+7 (800) 777-98-16

+7 (495) 640-16-58

vet94@rosvet.ru

mdz@rosvet.ru

[www.td-prostore.ru](http://www.td-prostore.ru)



## Рекомендуемые схемы вакцинации

Возраст животного	Первичная вакцинация				
6 недель	Глобкан или Гискан*	Глобкан или Гискан*	Глобкан или Гискан*	Глобкан или Гискан*	Глобкан или Гискан*
8-10 недель	Мультикан-4 + Рабикс одновременно или с интервалом 1-7 дней	Мультикан-6 + Рабикс одновременно или с интервалом 1-7 дней	Мультикан-8	Астерион DHPPiL + Рабикс одновременно или с интервалом 1-7 дней	Астерион DHPPiLR
11-13 недель	Мультикан-4 + Рабикс одновременно или с интервалом 1-7 дней	Мультикан-6 + Рабикс одновременно или с интервалом 1-7 дней	Мультикан-8	Астерион DHPPiL + Рабикс одновременно или с интервалом 1-7 дней	Астерион DHPPiLR
10-12 месяцев	Мультикан-4 + Рабикс**	Мультикан-6 + Рабикс** или Мультикан-8**	Мультикан-6 + Рабикс** или Мультикан-8**	Астерион DHPPiL + Рабикс** или Астерион DHPPiLR**	Астерион DHPPiL + Рабикс** или Астерион DHPPiLR**

Ранее не вакцинированных взрослых животных вакцинируют по аналогичной схеме

Собак мелких и декоративных пород, включая щенков, вакцинируют в дозе 1 мл.

Для этого лиофилизированный компонент вакцины растворяют в 1 мл прилагаемого жидкого компонента.

Животных, получивших первичный курс прививок, ревакцинируют ежегодно однократно.

\* При неблагополучной эпизоотической ситуации.

\*\* Введение антирабической вакцины требуется при неблагополучной эпизоотической ситуации по бешенству и (или) неустановленном уровне антирабических антител (FAVN)