

ФУЛГАРД®

Глутаровый альдегид, композиция двух четвертичных аммониевых соединений
Раствор для дезинфекции

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ С ВЫГОДНОЙ СТОИМОСТЬЮ ОБРАБОТКИ И МИНИМАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ



видео о продукте
Фулгارد
(свиноводство)



видео о продуктах
Дезоклин и Фулгارد
(птицеводство)





ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Фулгард®

Абсолютная защита




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективен против патогенов 1, 2, 3 и 4 групп устойчивости¹, в особенности против вируса АЧС²
- Выгодная стоимость обработки
- Экспозиция при профилактике - 20 минут
- Не разрушает металлы, пластмассу, резину и другие материалы

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный дезинфектант с выгодной стоимостью обработки и минимальной экспозицией.

СОСТАВ



250 мг глutarовый альдегид
210 мг алкилдиметилбензиламмония хлорид
30 мг дидецилдиметиламмония хлорид

¹ По результатам ФБУН НИИД Роспотребнадзора, «Протокол микробиологических исследований № 02-111.Н/17, от 03.07.2017».

² По результатам ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, «Отчет испытаний дезинфицирующей активности средства «Фулгард» производства ООО «НИТА-ФАРМ» в отношении возбудителя АЧС».



Для точного расчета необходимого объема препарата воспользуйтесь **КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК** на сайте **WWW.NITA-FARM.RU**

РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ С УЧЕТОМ ЦЕЛИ И МЕТОДА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Дезинфекция при АЧС



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ АЧС
ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ 0,3%

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ²
Метод орошения. Вынужденная при АЧС	30 минут	0,3	300

Влажная дезинфекция (метод пенной генерации, орошения и протирания поверхностей)



Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ²
Профилактическая	20-30 минут	0,15	250-350
Вынужденная (кроме ООИ ³)	3 часа	0,3	200-400
Вынужденная при ООИ ³	3 часа	1	200-400

Возможна локальная дезинфекция отдельных, свободных от птицы клеток, единиц оборудования, инвентаря и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствии людей и птицы в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

Аэрозольная дезинфекция



Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ³
Профилактическая и вынужденная (кроме ООИ ³)	6 часов	30	2,5

Подготовка дезковриков и дезбарьеров



Вид дезинфекции	Концентрация рабочего раствора, % для заправки дезковриков, дезбарьеров
Профилактическая и вынужденная	0,6 (в зимнее время - до 1,3-2)

Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже двух раз в 7 дней.

³ Особо опасные инфекции



Технологические процессы комплексов и ферм могут способствовать накоплению в местах содержания животных разнообразной микрофлоры, которая является причиной вспышек инфекционных заболеваний.

Для обеспечения стабильного ветеринарного благополучия животноводства требуется проведение комплекса мер борьбы и профилактики инфекционных болезней.

- **Профилактическую** дезинфекцию проводят в благополучных хозяйствах для предупреждения инфекционных заболеваний. Цель такой дезинфекции - снижение общей микробной контаминации помещений для предотвращения накопления и распространения микроорганизмов в окружающей животных и птиц внешней среде.
- **Вынужденная** дезинфекция включает текущую и заключительную дезинфекцию и выполняется в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным болезням животных и птицы, с целью локализации первичного очага инфекции, предотвращения распространения болезни внутри хозяйства и за его пределами.

Фулгард применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения, находящиеся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты и окружающие их территории (включая инкубатории, яйцесклады, территории выгулов и дорог), молочные блоки и кормокухни, санитарно-техническое оборудование, санбойни, убойные цеха и пункты, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду;
- производственные помещения, технологическое оборудование и территорию предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а также тару, спецодежду и предметы ухода за животными;
- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения);
- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

Фулгард® обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью (в том числе против вируса африканской и классической чумы свиней) и фунгицидным действием (в том числе против спорообразующих форм, дрожжей и плесени).

ФУЛГАРД® ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ПАТОГЕНОВ 1, 2, 3 И 4 ГРУПП УСТОЙЧИВОСТИ

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, срок хранения рабочих растворов - не более 30 суток.

**Переходите в раздел сайта NITA-FARM:
В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ**



УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

Болезни указаны в соответствии с системами органов, где протекает патологический процесс. Алфавитный указатель поможет Вам быстро найти ответы на интересующие вопросы



РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЗАДАЧ

Схемы лечения от NITA-FARM



WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.