



ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению вакцины Эурикан Primo

(организация-разработчик: Берингер Ингельхайм Анимал Хелс Франс ЭсСиЭс, 29
авеню Тони Гарнье, 69007, Лион, Франция / Boehringer Ingelheim Animal Health France
SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007, Lyon, France)

Номер регистрационного удостоверения: 250-Р-4.14-2902 НТБЦ-1-Р.3/01325

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Эурикан Primo (Eurican Primo).

Международное непатентованное наименование: Вакцина для профилактики парвовирусного энтерита собак.

2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.

Вакцина изготовлена из культуральной жидкости перевиваемой линии клеток CrFK, инфицированной парвовирусом собак (штамм CAG), с добавлением полипептидов, полиглицидов и гидролизата коллагена.

3. Вакцина по внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета.

Срок годности вакцины 36 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования. После вскрытия флакона вакцину необходимо использовать немедленно. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцина Эурикан Primo расфасована по 1 мл (1 иммунизирующая доза) в стеклянные флаконы, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной упакованы в коробки по 10 иммунизирующих доз (1 мл). В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению.

5. Вакцину хранят при температуре от 2°C до 8°C (в холодильной камере) в защищенном от света месте. Замораживание вакцины не допускается.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, с наличием посторонней примеси, выбраковывают и обеззараживают кипячением в течение 10 минут с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина Эурикан Primo отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Эурикан Primo относится к иммунобиологическим препаратам

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у собак к возбудителю парвовирусного энтерита через 14-21 сутки после введения, продолжительностью 12 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится не менее $10^{5.5}$ CCID₅₀ аттенуированного парвовируса собак.

Вакцина безвредна, не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия, безопасна при применении беременным и лактирующим животным; лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики парвовирусного энтерита собак.

12. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных. За 10 дней до вакцинации необходимо провести дегельминтизацию собаки.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения. По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.

При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

14. Вакцина безопасна при применении беременным и лактирующим животным.

15. Вакцину Эурикан Primo вводят подкожно в область лопатки собакам с 6-недельного возраста двукратно с интервалом 6 недель, в дозе 1 мл независимо от массы и породы. При неблагоприятной эпизоотической ситуации допускается первичная вакцинация с 4-х недельного возраста и дополнительная инъекция через 2-3 недели после первого введения.

Ревакцинацию собак проводят через год, далее – каждые 2 года. При неблагоприятной эпизоотической ситуации рекомендуется ежегодная ревакцинация.

Для ревакцинаций допустимо использование моно- или поливалентной вакцины, содержащей парвовирус: Эурикан DHPPI2, Эурикан DHPPI2-L, Эурикан DHPPI2-LR или Гексадог производства компании Берингер Ингельхайм Анимал Хелс Франс ЭсСиЭс.

При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В исключительных случаях возможна реакция гиперчувствительности и анафилактическая реакция. В этом случае проводят симптоматическое лечение.

17. Симптомов проявления парвовирусного энтерита собак или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

18. Запрещается смешивать Эурикан Primo с другими иммунобиологическими препаратами в одном шприце. Данные о возможности использования вакцины Эурикан Primo одновременно с другими иммунобиологическими препаратами отсутствуют.

19. Особенности поствакцинальной реакции при первичной и повторных иммунизациях не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики парвовирусного энтерита собак. В случае пропуска очередного введения необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Эурикан Primo не устанавливаются.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

Берингер Ингельхайм Анимал Хелс Франс, ру де л'Авиасьон, 69800 Сан Прист, Франция / Boehringer Ingelheim Animal Health France, rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, France;

Берингер Ингельхайм Анимал Хелс Франс, Шеми де Крузоль, 69210 Лентили, Франция / Boehringer Ingelheim Animal Health France, Chemin de Cruzols, 69210 Lentilly, France

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя/Импортер

ООО «Берингер Ингельхайм»,
Российская Федерация,
125171, Москва, Ленинградское шоссе,
16А, стр.3
Тел.: +7 495 544 50 44

Менеджер по регистрации
подразделения ветеринарных препаратов
ООО «Берингер Ингельхайм»



Полухина Ю.А.