

АЗИНОКС ПЛЮС

Состав и фармакологические свойства.

В качестве действующего вещества в 1 таблетке содержит празиквантел – 50 мг и пирантела памоат – 150 мг, а также вспомогательные компоненты.

Празиквантел, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия на все фазы развития ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, вызывает паралич и гибель гельминта. Празиквантел всасывается в желудочно-кишечном тракте животного, его максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30–60 минут. Пирантела памоат – обладает широким спектром антигельминтного действия против нематод. Пирантела памоат плохо всасывается, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике.

Показания к применению.

Для лечения и профилактики нематодозов (токсокарозов, токсаскаридозов, унцинариозов, анкилостомозов) и цестодозов (тениозов, дипилидиозов, эхинококкозов, дифиллоботриозов, мезоцестоидозов) собак.

Противопоказания.

Препарат не следует применять щенным, а также кормящим сукам в течение 10 дней после родов, а также щенкам моложе 3-недельного возраста. Индивидуальная непереносимость.

Дозы и порядок применения.

«Азинокс плюс» для собак применяют перорально индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно в дозе 1 таблетка на 10 кг массы животного.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией животных не требуется.

С лечебной целью собак дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально в терапевтической дозе.

При фермерских и приотарных собак против возбудителей тениозов дегельминтизируют с декабря по апрель через каждые 45 дней, с мая по ноябрь – через каждые 30 дней.

Побочные явления.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают.

Хранение.

Хранят «Азинокс плюс» для собак в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°С до 25°С в местах, недоступных для детей и животных.

Форма выпуска.

Плоские таблетки желтого цвета, имеющие с одной стороны риску, с другой – логотип (крест в центре щита). Таблетки упакованы по 3 и 6 штук в блистер. Внешняя упаковка – картонная коробка.