

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

01.03.2021

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
*Байкокс® 2,5%*

(Организация-разработчик: «Bayer Animal Health GmbH», Kaiser-Wilhelm-Allee 20, D-51373 Leverkusen, Germany/ «Байер Энимал Хелс ГмбХ», Кайзер-Вильгельм-Аллее 20, D-51373 Леверкузен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-8.0-2994№ПВИ-2-6.6/00177

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: торговое наименование: Байкокс® 2,5% (Ваусох® 2,5%); международное непатентованное наименование действующего вещества: толтразурил.
2. Лекарственная форма: раствор для орального применения. Байкокс® 2,5% в 1 мл содержит действующее вещество толтразурил — 25 мг и вспомогательные вещества: триэтаноламин и пропиленгликоль.
3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную жидкость. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения — 3 года с даты производства. Не применять по истечении срока годности.
4. Выпускают препарат Байкокс® 2,5% расфасованным по 100 мл и 1000 мл в пластиковые флаконы и бутылки с навинчиваемыми полимерными крышками. Каждая потребительская упаковка сопровождается инструкцией по применению.
5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.
6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Байкоккс® 2,5% относится к антикокцидийным лекарственным препаратам группы триазинтриона.

10. Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, является производным триазинтриона, обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении всех видов паразитирующих у птиц кокцидий на стадиях внутриклеточного развития паразитов, включая *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. mitis*, *E. praecox*, *E. adenoides*, *E. meleagridis*, *E. anseris*, в том числе устойчивых к другим антикокцидийным препаратам.

Толтразурил, блокируя дыхательные ферменты кокцидий, оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов.

После перорального введения толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках желудочно-кишечного тракта. Выводится толтразурил из организма птиц в основном в неизменном виде, а также в виде метаболитов с пометом.

Байкоккс® 2,5% по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у птиц побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу.

## III. Порядок применения

11. Байкоккс® 2,5% назначают цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам при кокцидиозе с лечебно-профилактической целью, при достижении в подстилке критического уровня кокцидий (10-20 тыс./г), а также при появлении у птиц клинических признаков заболевания.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата Байкоккс® 2,5% является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применение лекарственного препарата Байкоккс® 2,5% курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением препарата в яйцах.

13. При работе с препаратом Байкоккс® 2,5% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с лекарственным препаратом Байкоккс® 2,5% запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Байкоккс® 2,5%.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Байкоккс® 2,5% не предназначен для применения беременным и лактирующим самкам.

15. Байкоккс® 2,5% применяют птице с водой для поения два дня подряд в дозе 7 мг толтразурила (ДВ) на 1 кг массы (28 мл препарата Байкоккс® 2,5% на 100 кг массы птицы), что эквивалентно:

- 1 мл препарата Байкоккс® 2,5% на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице в течение 48 часов подряд

или

- 3 мл препарата Байкоккс® 2,5% на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов в сутки два дня подряд.

В тяжелых случаях заболевания при необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

В период применения лекарственного препарата Байкоккс® 2,5% лечебный раствор должен быть единственным источником питьевой воды для птиц.

Лечебный раствор сохраняет свою активность в течение 48 часов. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно перемешать.

16. Побочных явлений и осложнений у птиц при применении лекарственного препарата Байкоккс® 2,5% в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

17. При передозировке препарата у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды, потеря массы. В случае появления симптомов передозировки применение препарата следует прекратить.

18. Не следует применять лекарственный препарат Байкоккс® 2,5% одновременно с другими антикокцидийными препаратами.

Байкоккс® 2,5% совместим с лекарственными препаратами других фармакологических групп и известными кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве.

19. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

20. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата птицам при тяжелом течении кокцидиоза, его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

21. Убой цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, индеек — не ранее, чем через 16 суток после последнего применения лекарственного препарата Байкокк® 2,5%.

В случае вынужденного убоя ранее установленных сроков, мясо птиц может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH», Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Germany/ «КВП Фарма + Ветеринэр Продукте ГмбХ», Пројенсдорфер штрассе 324, D-24106 Киль, Германия

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Эланко Рус», 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, эт.16, пом. 1Б, ком.13.