

ДОЗИРОВОЧНАЯ КАРТА*

ПОКАЗАНИЯ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ курса (всего дней)	СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ				ОПИСАНИЕ КУРСА	КУРСЫ В ГОД
		ДНИ курса	ФОРМА выпуска	ДОЗА мг на 1 кг	КРАТНОСТЬ в сутки		
Стандартная курсовая терапия: 1 неделя (ампулы) + 3 недели (таблетки). 4 курса в год							
Острое состояние	от 7 дней	с 1 по 7 день с 8 по 15 день	амп амп/тб	15 7,5	2 2	В острый период заболевания препарат применяют начиная с дозы 15 мг/кг 7 дней, затем при необходимости дозу снижают в 2 раза. Курс лечения раствором для инъекций от 7 до 15 дней.	-
Хроническое состояние/поддержание эффекта проводимой терапии	21 день	с 1 по 21 день	тб	7,5	2	При хронической патологии и для поддержания терапевтического эффекта рекомендуется применение в дозе 7,5 мг/кг длительностью 3 недели до 4 раз в год.	4 курса
Рекомендации курсовой терапии по показаниям:							
Ветеринарная гериатрия	37 дней	с 1 по 7 день с 8 по 37 день	амп тб	10 5	2 2	В качестве лечебно-профилактического средства в ветеринарной гериатрии препарат применяют в дозе 10 мг/кг (ампулы) 7 дней. Далее рекомендован переход на таблетированную форму 5 мг/кг 30 дней.	4 курса
Профилактика наркозных осложнений и восстановление в послеоперационный период	28 дней	с 1 по 3 день с 4 по 6 день с 7 по 28 день 1 день в период операции	амп/тб амп/тб тб амп	15 15 7,5 20	2 2 2 1	Для профилактики наркозных осложнений препарат применяют в дозе 15 мг/кг за 3 дня до операции. В послеоперационный период рекомендовано применение препарата в дозе 15 мг/кг 3 дня после операции. Далее рекомендован переход на таблетированную форму в дозе 7, 5 мг/кг 21 день в послеоперационном периоде и до полного восстановления. При длительном наркозе, тяжелом клиническом состоянии животного препарат вводят дробно в дозе 20 мг/кг.	-
Неврология (ЧМТ, эпилепсия/эписиндром, нейроинфекция)	28 дней	с 1 по 7 день с 8 по 28 день	амп тб	15 7,5	2 2	В острый период заболевания препарат применяют начиная с дозы 15 мг/кг. Для поддержания терапевтического эффекта рекомендован переход на таблетированную форму в дозе 7, 5 мг/кг 21 день.	2 курса
Дерматология (дерматиты, экземы, язвы, раны, профилактика)	28 дней	с 1 по 7 день с 8 по 28 день	амп тб	15 7,5	2 2	В острый период заболевания препарат применяют начиная с дозы 15 мг/кг. Для поддержания терапевтического эффекта рекомендован переход на таблетированную форму в дозе 7, 5 мг/кг 21 день.	2 курса
Инттоксикации	28 дней	с 1 по 7 день с 8 по 28 день	амп тб	15 7,5	2 2	В острый период заболевания препарат применяют начиная с дозы 15 мг/кг. Для поддержания терапевтического эффекта рекомендован переход на таблетированную форму в дозе 7, 5 мг/кг 21 день.	-
Сердечно-сосудистые и сердечно-лёгочные заболевания	28 дней	с 1 по 7 день с 8 по 14 день с 15 по 28 день	амп тб тб	15 15 7,5		В острый период заболевания препарат применяют начиная с дозы 15 мг/кг. Затем рекомендован переход на таблетированную форму 24 дня: в первые 10 дней по 15 мг/кг и по 7,5 мг/кг оставшиеся 14 дней.	2 курса
Адаптация к стрессу (участие в выставках, транспортировка)	10 дней	с 1 по 5 день с 6 по 10 день	амп тб	5 5	2 2	Для повышения адаптации животного к новой обстановке препарат применяют за 5 дней до предполагаемого мероприятия, затем терапию продолжают после мероприятия еще 5 дней для восстановления.	-

* Доза, продолжительность и кратность применения назначается лечащим врачом в зависимости от тяжести клинического состояния животного.
При внутривенном способе введения препарат разводят физиологическим раствором в 2 и более раза.